

30/08

Paciente: Nelson Duarte Silva

01/03/08 26/03/08

Tratamento com aparelhamento
de 1º e 2º pododactilo.

Regulagem de colar

☐ 100% ☒ 75% ☐ 50% ☐ 25% ☐ 10%

☒ MELHORADO ☐ EM MOVIMENTO ☐ EM PÉDIDO ☐ CURADO ☐ OUTRO

Tratamento com ferimento lateral
no 1º e 2º pododactilo.

ORIENTAÇÕES PÓS ALTA

Relatório de evolução por 30 dias
Retorno às atividades com colar por 30 dias
Retorno às atividades com colar por 90 dias

COM A FERIDA OPERATORIA: 1. Usar a pomada antibiótica e analgésica sempre que necessário.
2. Manter a ferida limpa e coberta.
3. Evitar a exposição solar direta na ferida.
4. Evitar a ingestão de alimentos muito quentes ou frios.
5. Evitar a ingestão de alimentos muito duros.

PARA CASA: 1. Usar a pomada antibiótica e analgésica sempre que necessário.
2. Manter a ferida limpa e coberta.
3. Evitar a exposição solar direta na ferida.
4. Evitar a ingestão de alimentos muito quentes ou frios.
5. Evitar a ingestão de alimentos muito duros.

30/08, 26/03/08

DATA ASS. MÉDICO (CRM)

1. Tratamento clínico do 1º e 2º pododactilo em hospitalar
2. Tratamento clínico do 1º e 2º pododactilo em ambulatório
3. Tratamento clínico do 1º e 2º pododactilo em consultório

TRABALHO COM 100% ADE DE TRATAMENTO
AUTENTICAÇÃO
02 SET. 2008
ESCREVENTE